

***Крок M Сестринська справа***  
***Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю***

**1**

До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз - проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A** \*Асептичну бінокулярну  
**B** Асептичну монокулярну  
**C** Колову  
**D** Монокулярну лейкопластирну  
**E** Косинкову

**2**

До травмпункту звернувся пацієнт, у якого різана рана гомілки. Після проведення ПХО рани лікар призначив щеплення проти правцю. Яку потенційну проблему попередив лікар?

- A** \*Захворювання на правець  
**B** Виникнення сепсису  
**C** Захворювання на сказ  
**D** Виникнення тромбозу  
**E** Захворювання на бешиху

**3**

Пацієнка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

- A** \*Цитологічне дослідження  
**B** Ендоскопічне обстеження  
**C** Ехографія  
**D** Комп'ютерна томографія  
**E** Лабораторні дослідження

**4**

У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржиться медичній сестрі на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка її тактика в даній ситуації?

- A** \*Повідомити лікаря  
**B** Дати протиблюмотик  
**C** Запропонувати снодійне  
**D** Порекомендувати дотримуватися дієти  
**E** Застосувати знеболювальне

**5**

Пацієнт 63 років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іrrадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежно сестринське втручання виконає медсестра?

- A** \*Тепла грілка на поперекову ділянку  
**B** Зігрівальний компрес  
**C** Банки  
**D** Mixur з льодом  
**E** Гірчицники

**6**

Пацієнт 70 років звернувся до лікаря зі скаргами на часте сечовиділення вночі, часті термінові позиви, утруднення при сечовиділенні. Після обстеження лікар встановив діагноз: “Аденома передміхурової залози II-А”. Яка пріоритетна потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** \*Гостра затримка сечі
- B** Нетримання сечі
- C** Зміна кольору сечі
- D** Розлади діурезу
- E** Хронічна ниркова недостатність

**7**

У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A** \*Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти гірчицники на грудну клітку
- C** Поставити банки
- D** Зробити масаж грудної клітки
- E** Зігриваючий компрес

**8**

Медична сестра супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку.

Діагностовано

- рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповість пацієнту медична сестра?
- A** \*Порадить звернутися до лікаря
- B** Скаже справжній діагноз
- C** Промовчить
- D** Заспокоїть хворого
- E** Скаже неправдивий діагноз

**9**

Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** \*Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B** Ввести спазмолітики
- C** Попередити западання язика
- D** Ввести серцеві засоби
- E** Налагодити інгаляцію зволоженого кисню

**10**

Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A** \*Втрата рівноваги
- B** Отогенний сепсис
- C** Отогенний менінгіт
- D** Абсцес мозку та мозочка
- E** Синустромбоз

## **11**

У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози III стадії. Який основний метод лікування?

- A** \*Комплексний
- B** Хірургічний
- C** Хіміотерапія
- D** Гормонотерапія
- E** Променевий

## **12**

До медичної сестри хірургічного кабінету звернулась сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнці?

- A** \*Негайно звернутися до онколога або хірурга
- B** Вживати знеболюючі засоби
- C** Вживати таблетки церукалу
- D** Дотримуватися дієти
- E** Пройти ультразвукове обстеження шлунка

## **13**

Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об'ективно: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A** \*Ячмінь
- B** Халязіон
- C** Абсцес
- D** Флегмона
- E** Алергічний набряк

## **14**

Ви медична сестра урологічного відділення. Лікарем призначено провести промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин необхідно підготувати?

- A** \*Розчин фурациліну 1:5000
- B** 0,9% розчин хлориду натрію
- C** 3% розчин перекису водню
- D** 0,9% розчин хлориду натрію
- E** 0,9% розчин натрію гідрокарбонату

## **15**

Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

- A** \*Клінічна смерть
- B** Агонія
- C** Предагонія
- D** Післяопераційний період
- E** “Соціальна смерть”

## **16**

Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:

- A** \*Перфорація виразки
- B** Субкомпенсований стеноз
- C** Некомпенсований стеноз
- D** Пенетрація виразки
- E** Шлунково-кишкова кровотеча

## **17**

В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, “кардонічна посмішка”, опістотонус. Що з хворим?

- A** \*Правецесть
- B** Інфікована рана
- C** Сказ
- D** Газова гангрена
- E** Гнилісна інфекція

## **18**

В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого приступу глаукоми. Медсестра повинна виконати наступні лікарські призначення:

- A** \*Закапувати 1% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години
- B** Закапати 1% атропін, 0,25% скополамін, 1% гоматропін
- C** Закапати 30% сульфацил натрію, 0,25% левоміцетин
- D** Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь
- E** Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон

## **19**

На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна:

- A** \*Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B** Обробити краї повік розчином дімедролу
- C** Обробити краї повік розчином анальгіну
- D** Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E** Обробити краї повік розчином атропіну

## **20**

Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пилорамі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A** \*Аудіометрії
- B** Отоскопії
- C** Діафаноскопії
- D** Рентгенографії вуха
- E** Вестибулометрії

## **21**

Жінку доставлено у відділення реанімації з ознаками отруєння чадним газом. Пацієнту терміново готують до проведення:

- A** \*Гіпербаричної оксигенациї

- B** Ентеросорбції
- C** Форсованого діурезу
- D** Гемосорбції
- E** Плазмаферезу

**22**

Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:

- A** \*Метанолом
- B** Етанолом
- C** Опіатами
- D** Фософорорганічними сполуками
- E** Ацетатною кислотою

**23**

До лікаря звернулася пацієнтки зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнту?

- A** \*Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтіграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

**24**

Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:

- A** \*2 хв.
- B** 3 хв.
- C** 5 хв.
- D** 8 хв.
- E** 10 хв.

**25**

Невідкладна допомога при нирковій коліці:

- A** \*Введення баралгіну
- B** Холод на поперек
- C** Назначення діуретиків
- D** Введення натрію хлориду
- E** Введення глюкозидів

**26**

Найбільш інформативний метод діагностики виразкової хвороби шлунка:

- A** \*Фіброгастроскопія
- B** Рентгеноскопія
- C** Лапароскопія
- D** УЗД
- E** Сканування

**27**

Збільшення діастази сечі характерно для:

- A** \*Гострого панкреатиту
- B** Гострого апендициту
- C** Защемленої грижі
- D** Проривної виразці шлунку
- E** Для інвагинації

**28**

При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді використовують:

- A** \*Катетеризацію сечового міхура
- B** Холод на лоно
- C** Внутрішньовенно глюкозу
- D** Внутрішньовенно натрію хлорид 10%
- E** Внутрішньовенно еуфілін

**29**

Можливі ускладнення при тромбофлебіті нижніх кінцівок:

- A** \*Тромбоемболія
- B** Беших
- C** Слоновість
- D** Остеомієліт
- E** Періостит

**30**

Симптом “переміжної кульгавості” характерний для захворювання:

- A** \*Облітеруючий ендартерійт
- B** Флеботромбоз
- C** Флебит
- D** Ревматоїдний артрит
- E** Тромбофлебіт

**31**

Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A** \*Накладання оклюзійної пов’язки
- B** Дренаж по Суботіну
- C** Протикашлеві препарати
- D** Плевральна пункція
- E** Введення наркотиків

**32**

До передракових захворювань прямої кишki відноситься:

- A** \*Поліпоз прямої кишki
- B** Парапроктит
- C** Хронічний коліт
- D** Сигмоїдит

**E** Випадіння прямої кишки

**33**

Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?

- A** \*Раптовий “кінджальний біль”
- B** Оперізуючий біль
- C** Симптом Пастернацького
- D** Блювання “кавовою гущею”
- E** Метеоризм

**34**

Лікворея виникає при:

- A** \*Переломі основи черепа
- B** Забой головного мозку
- C** Пораненні склепіння черепа
- D** Струсі головного мозку
- E** Здавленні головного мозку

**35**

Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск - 60 мм рт.ст. Відображені картина дозволяє запідозрити:

- A** \*Гострий напад глаукоми
- B** Гострий іридоцикліт
- C** Повзучу виразку рогівки
- D** Метагерпетичний кератит
- E** Кератокон'юнктивіт

**36**

Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A** \*Тонометрії
- B** Візометрії
- C** Периметрії
- D** Кампіметрії
- E** Офтальмоскопії

**37**

У хвого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно провести?

- A** \*Правця
- B** Чуми
- C** Бешихи
- D** Сифілісу
- E** Токсоплазмозу

**38**

Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали

джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- A** \*Накладання захисної асептичної пов'язки на рану
- B** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- C** Холод на місце травми
- D** Іммобілізація пошкодженої кінцівки
- E** Надання хворому зручного положення

**39**

Утопленого чоловіка 48 років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Свідомість відсутня, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом “з рота в рот” і масаж серця. Яка з перелічених ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- A** \*Звуження зіниць
- B** Підвищення артеріального тиску
- C** Прискорення пульсу
- D** Сповільнення пульсу, часте дихання
- E** Прискорення дихання