

Крок М Сестринська справа
Невідкладні стани в терапії

1

У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A** *Преднізолон
- B** Дібазол
- C** Інсулін
- D** Пеніцилін
- E** Анальгін

2

У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Адреналін
- B** Анальгін
- C** Дібазол
- D** Но-шпу
- E** Дицинон

3

Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A** *Припинити зондування
- B** Продовжити зондування
- C** Зробити перерву
- D** Поставити грілку на живіт
- E** -

4

У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

- A** *Ввести судинні засоби
- B** Покласти грілки до ніг
- C** Дати випити каву
- D** Підняти ніжний кінець ліжка
- E** Забрати подушку з-під голови

5

У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

- A** *Забезпечити повний фізичний та психічний спокій
- B** Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- C** Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- D** Годування пацієнта та догляду за порожниною рота
- E** Слідкувати за фізіологічними відправленнями

6

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?

- A** *Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол
- B** Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- C** Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку
- D** Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру
- E** Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

7

Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту?

- A** *Випити солодкого чаю
- B** Укласти в ліжку, зігріти
- C** Прийняти заспокійливі
- D** Прийняти цукрознижуючі
- E** -

8

Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190-110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

- A** *Гіпертензивного
- B** Гострої серцевої недостатності
- C** Вінцевої недостатності
- D** Гіпотензивного
- E** Гострої судинної недостатності

9

Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати в першу чергу?

- A** *Нітрогліцерин
- B** Ніфедипін
- C** Аспірин
- D** Атенотол
- E** Папаверин

10

Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра чиста, волога, гіпертонус м'язів. АТ- 115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Гіперосмолярна кома
- C** Молочнокисла кома
- D** Гіперглікемічна кома
- E** Церебральна кома

11

В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом'язово у пацієнта з'явилися шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрити медична сестра?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Непритомність
- C** Колапс
- D** Кардіогенний шок
- E** Токсико-інфекційний шок

12

У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

- A** *Амінокапронову кислоту
- B** Анальгін
- C** Адреналін
- D** Гемостимулін
- E** Вітамін В₁₂

13

Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A** *Шлункова кровотеча
- B** Легенева кровотеча
- C** Гемороїдальна кровотеча
- D** Стравохідна кровотеча
- E** Маткова кровотеча

14

Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій?

- A** *Накласти міхур з льодом
- B** Накласти пов'язку з фурациліном
- C** Ввести р-н анальгін
- D** Обробити розчином йоду
- E** Прикласти грілку до місця укусу

15

У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41 °С), тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A** *Тиреотоксична криза
- B** Гіпертонічна криза
- C** Порушення мозкового кровообігу
- D** Напад серцевої астми
- E** Напад стенокардії

16

У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З'явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння "мушок" перед очима, нудота. Об'єктивно: АТ- 260/100 мм рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?

- A** *Гіпертонічна криза
- B** Стенокардія
- C** Гостре порушення мозкового кровообігу
- D** Інфаркт міокарду
- E** Гостра лівошлуночкова недостатність

17

У пацієнтки на цукровий діабет з'явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ- 100/60 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м'які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворої?

- A** *Гіперглікемічна кома
- B** Гіперсмолярна кома
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремічна кома
- E** Печінкова кома

18

У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно: блідий, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

- A** *Інфаркт міокарду
- B** Шок
- C** Колапс
- D** Серцеву астму
- E** Стенокардію

19

В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився "кинджальний" біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A** *Перфорація
- B** Пенетрація
- C** Пілоростеноз
- D** Малігнізація
- E** Шлункова кровотеча

20

Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об'єктивно: набряк губ, язика, мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** *Набряк Квінке
- B** Гострий риніт
- C** Анафілактичний шок
- D** Кропив'янка
- E** Астматичний статус

21

Пацієнт 42 років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

- A** *Дицинон
- B** Диклофенак
- C** Дипіридамол
- D** Димедрол
- E** Дилтіазем

22

Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4-5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?

- A** *Нітрогліцерин
- B** Нітроксолін
- C** Димедрол
- D** Омнопон
- E** Папаверин

23

Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту "кофейной гущей", дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?

- A** *Желудочно-кишечное кровотечение
- B** Перфорация язвы
- C** Пенетрация
- D** Малигнизация
- E** Стеноз привратника

24

Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?

- A** *Гипогликемическая кома
- B** Гипергликемическая кома
- C** Уремическая кома
- D** Печеночная кома
- E** Анафилактический шок

25

Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Внезапно возникла резкая "кинжальная" боль в эпигастральной области, слабость, головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации:

- A** *Вызвать врача
- B** Ввести анальгин
- C** Ввести спазмолитики
- D** Промыть желудок
- E** Дать теплое питье

26

У пацієнта онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з'явилася слабкість, знизилася маса тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 100 уд/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння виявлені атипівні клітини. Яку до лікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу чергу?

- A** *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти теплу грілку на грудну клітку
- C** Поставити гірчичники на стегно
- D** Провести оксигенотерапію
- E** -

27

У пацієнта після вживання меду з'явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. шкірні покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс - 92 уд/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

A *Набряк Квінке

B Кропив'янка

C Сироваткова хвороба

D Напад бронхіальної астми

E Анафілактичний шок

28

У пацієнтки 54, яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати?

A *40% розчин глюкози

B 0,9% розчин хлориду натрію

C Інсулін

D Кордіамін

E Строфантин

29

Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс - 108/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?

A *Гострий інфаркт міокарда

B Набряк легень

C Стенокардія

D Міокардит

E Сухий плеврит

30

У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з'явилась різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об'єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. Рс- 110/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки:

A *Анафілактичний шок

B Астматичний статус

C Травматичний шок

D Геморагічний шок

E -

31

Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах ацетону в повітрі. Пульс - 115/хв., ритмічний, АТ- 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра пацієнта?

A *Визначення рівня глюкози в крові

B Визначення вазопресину в крові

C Визначення креатиніну крові

D Визначення рівня білірубіну

E Визначення рівня рН крові

32

У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова дія медсестри?

- A** *Надати напівсидячого положення з опущеними ногами
- B** Надати положення з опущеною головою
- C** Надати горизонтального положення з піднятими ногами
- D** Надати сидячого положення
- E** Надати положення на боці

33

Пацієнтка лікується з приводу цукрового діабету. Поскаржилася медсестрі на відчуття голоду, слабості, тремтіння рук. Якою буде першочергова дія медсестри?

- A** *Дати солодкий чай або цукор
- B** Ввести розчин глюкози 5%
- C** Ввести розчин глюкози 20%
- D** Ввести інсулін короткої дії
- E** Ввести інсулін пролонгованої дії

34

Дівчина 19 років після тривалого знаходження в душному приміщенні раптово знепритомніла. Об'єктивно: блідість шкіри, Ps- 90/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. Вкажіть незалежне медсестринське втручання:

- A** *Надати положення з припіднятими ногами
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести адреналін
- D** Ввести кальцію хлорид
- E** Надати хворій положення сидячи

35

Хворий 54 років скаржиться на головний біль, запаморочення, слино- та сльозотечу, нудоту, блювання, біль в животі. В день, коли захворів, розфасовував мішки з хлорофосом. Об'єктивно: шкіра волога. Зіниці звужені. Ps- 50/хв. Посіпування м'язів язика та обличчя. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A** *Гостре отруєння хлорофосом
- B** Гостре отруєння свинцем
- C** Гостре отруєння ртуттю
- D** Гостре отруєння гранозаном
- E** Гостре отруєння миш'яком

36

У пацієнта 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: "Абсцес правої легені", після виділення гнійного смердючого харкотиння "повним ротом" виник кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої крові. Які першочергові дії медсестри?

- A** *Викликати лікаря
- B** Ввести анальгін
- C** Ввести еуфілін
- D** Ввести дицинон
- E** Ввести кальцію глюконату

37

У пацієнта Д., 48 років, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом: “Гострий інфаркт міокарда”, раптово вночі виник напад інспіраторної задишки з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Яке медсестринське втручання виконає медсестра при наданні невідкладної допомоги?

A *Інгаляцію кисню, насиченого 96% етиловим спиртом

B Дати хворому нітрогліцерин під язик

C Налагодити інгаляцію кисню, зволоженого водою

D Надати пацієнту напівсидячого положення

E -

38

Медична сестра, оцінюючи стан пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні з діагнозом: “цироз печінки”, звернула увагу, що він став млявим, сонливим. Хворий поскаржився на зниження апетиту, нудоту, біль у животі, підвищення температури тіла. Що необхідно виконати медичній сестрі в першу чергу?

A *Негайно повідомити лікаря

B Взяти кров з вени на біохімічне дослідження

C Визначити добовий діурез

D Провести штучне годування хворого

E Ввести розчин глюкози внутрішньовенно крапельно