

Крок М Лікувальна справа
Невідкладні стани у внутрішній медицині

1

Фельдшер “швидкої допомоги” прибув до пацієнта В., 35 років. Пацієнт непритомний. Шкіра - жовтянична. Печінка на 2 см випинається з-під краю ребрової дуги. Від пацієнта чути специфічний солодкуватий печінковий запах. Оберіть медикаменти для надання невідкладної допомоги:

- A** *Глюкоза, есенціале
- B** Амінокапронова кислота, баралгін
- C** Кальцію хлорид, вікасол
- D** Анальгін, димедрол
- E** Папаверин, баралгін

2

Вас викликали до хворого який скаржиться, на гострий біль в ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку, тривалістю більш 30 хв. Приймання нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

- A** *Гострий інфаркт міокарда
- B** Стабільна стенокардія напруження
- C** набряк легень
- D** Сухий плеврит
- E** Госпітальна пневмонію

3

Фельдшера викликали до хворого 45 років, який скаржиться на сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння “мушок” перед очима, АТ- 220/110мм рт.ст.

Такий стан характерний для?

- A** *Гіпертонічного кризи
- B** Печінкової коми
- C** Гіпоглікемічної коми
- D** Діабетичної коми
- E** Анафілактичного шоку

4

Хвора 40 років скаржиться на інтенсивний біль в поперековій ділянці справа з іррадіацію в стегно, статеві органи, часті болісні позиви на сечовивипускання. Який стан можна запідозрити у хворої?

- A** *Ниркова колька
- B** Печінкова колька
- C** Кишкова колька
- D** Гострий гломерлонефрит
- E** Гострий піелонефрит

5

У хворого В, 38 р., через 20 хвилин після введення 36 Од інсуліну виникла загальна слабкість, пітливість, тремор кінцівок. Це характерно для?

- A** *Стану гіпоглікемії
- B** Діабетної коми
- C** Печінкової коми
- D** Гіпертонічного кризи
- E** Колапсу

6

До фельдшера швидкої допомоги звернувся чоловік 35 років, у якого впродовж 12 років при контакті з квітковим пилком розвивалася ядуха. При зверненні: дихання за участю додаткових м'язів, АТ- 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., ЧД- 30/хв., при аускультатії з обох боків - ділянки "німих легень". Введення яких медикаментозних препаратів фельдшером доцільне в даній ситуації?

- A** *Глюкокортикостероїдів
- B** Антибіотиків
- C** Бета-адреноблокаторів
- D** Бета-адреноміметиків
- E** Спазмолітиків

7

Бригаду ШД викликали до пацієнта 47 років, який скаржиться на інтенсивний стискаючий біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Стан тяжкий, блідість шкірних покривів, акроціаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв., ЕКГ: ознаки гострого інфаркту міокарда. Який препарат слід використати фельдшеру для корекції АТ?

- A** *Допамін
- B** Мезатон
- C** Адреналін
- D** Сульфокамфокаїн
- E** Кофеїн

8

Ви фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта Л., 21 року, який після введення гентаміцину через декілька хвилин відчув нестачу повітря, свербіж долонь, почервоніння обличчя, запаморочення в голові. АТ знизився до 75/50 мм рт.ст., ЧД- 24/хв., Рс- 105/хв.. З якого препарату ви розпочнете невідкладну допомогу?

- A** *Гідрокортизон
- B** Кофеїн
- C** Кордіамін
- D** Папаверин
- E** Гідрокарбонат натрію

9

Фельдшер викликаний на дім до пацієнтки А., 64 роки, яка страждає на гіпертонічну хворобу. Після прийому каптопресу і атенололу пацієнтка різко встала з ліжка, втратила свідомість. Об'єктивно: шкіра бліда, волога. Пульс слабкий, 110/хвилину. Тони серця послаблені, АТ- 70/50 мм рт.ст.. Дихання везикулярне. Вкажіть найбільш імовірний діагноз фельдшера:

- A** *Колапс
- B** Серцева астма
- C** Набряк легенів
- D** Гострий інфаркт міокарда
- E** Гіпертонічний криз

10

До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка, яка страждає дифузною формою токсичного зобу. Стан погіршився після психо-емоційного стресу. З'явилися скарги на сильні головні болі, серцебиття. Об'єктивно: психічне і рухове збудження, рясний піт, шкірні покриви гіперемовані, фібрильна температура, тахікардія - 150/хв., гіпертензія - 150/50 мм рт.ст. Яке ускладнення, на думку фельдшера, розвинулось у пацієнтки?

- A** *Тіреотоксична криза
- B** Мікседематозна кома
- C** Адреналова криза
- D** Пароксизм миготливої тахіаритмії
- E** Екстрасистолія

11

Фельдшера викликали на дім до пацієнта, який страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції 32 одиниць інсуліну з'явився головний біль, слабкість, відчуття голоду, тремор рук, втрата свідомості. Об'єктивно: пацієнт без свідомості, зіниці розширені, судоми м'язів кінцівок.

АТ- 140/100 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний, шкіра волога. Який препарат введе фельдшер в першу чергу?

- A** *Глюкоза 40 % р-н
- B** Інсулін 40 ОД д/в
- C** Глюкоза 10 % р-н
- D** Фізіологічний розчин
- E** Гідрокарбонат натрію

12

ШМД викликали до хворого С. 69 років, у якого годину тому після фізичного навантаження раптово виник сильний біль за грудниною з ірадіацією у міжлопаткову ділянку. Під час огляду: стан тяжкий, свідомість порушена, шкіра бліда, волога. Рс- 100/хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. На ЕКГ: глибокий зубець Q та куполоподібний сегмент ST у відведеннях II-III. Яка невідкладна до лікарська допомога у цьому випадку?

- A** *Нітрогліцерин 0,0005 г сублінгвально, аспірин 0,25 г розжувати
- B** Створити фізичний та емоційний спокій
- C** Спокій, оксигенотерапія
- D** Спокій, гепарин 4000 ОД болюсно
- E** Спокій, атропін 0,5-1 мг в/в

13

Фельдшера ШМД викликали до пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, 30 хвилин тому з'явилися загальна слабкість, головокружіння, шум у вухах, "мерехтіння мушок" перед очима. Було блювання по типу "кавової гущі". Яка перша медична допомога доцільна у цьому випадку?

- A** *Покласти міхур з льодом на надчеревну ділянку, госпіталізація
- B** Покласти грілку на надчеревну ділянку, госпіталізація
- C** Ввести анальгетики, госпіталізація
- D** Промити шлунок, лишити вдома
- E** Ввести спазмолітики, госпіталізація

14

Швидку допомогу викликали до пацієнтки, яка скаржиться на сухість у роті, спрагу, нудоту. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно: запах ацетону з роту, шкіра суха, рум'янець на обличчі. Дихання глибоке, шумне, тони серця приглушені. Рс- 120/хв., слабого наповнення, АТ- 80/45 мм рт.ст. Через деякий час жінка втратила свідомість. Який першочерговий препарат для надання невідкладної допомоги треба ввести?

- A** *Інсулін короткої дії
- B** Р-н глюкози 40%
- C** Р-н глюкози 5%
- D** Мезатон 1 %
- E** Дибазол 1%

15

Виклик ШМД до пацієнта 43 р., який скаржиться на раптовий "кинджальний" біль у надчеревній ділянці. Шкіра бліда. Живіт дошкоподібний. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка. Вкажіть, для якого ускладнення виразкової хвороби характерні дані симптоми:

- A** *Перфорації
- B** Кровотечі
- C** Малігнізації
- D** Пілоростеноз
- E** Пенетрації

16

Фельдшера викликали до пацієнтки 30 р, яка мала скарги на напад ядухи з утрудненим видихом. Напад триває понад добу. ЧДР- 50/хв., над правою легенею дихання не вислуховується. Вкажіть найімовірніший попередній діагноз:

- A** *Астматичний статус
- B** Госпітальна невмонія
- C** Серцева астма
- D** Обструктивний бронхіт
- E** Бронхоектатична хвороба

17

Фельдшера ФАПу викликали до пацієнтки 30 р. Скарги на напад ядухи з експіраторною задишкою. Напад не усувається ефективними раніше сальбутамолом та еуфіліном, триває майже добу. Об'єктивно: стан тяжкий, ЧДР- 40/хв., вислуховується багато хрипів зі свистом у легенях з обох боків. Який основний препарат слід ввести пацієнту в даному випадку:

- A** *Преднізолон
- B** Астмопент
- C** Солутан
- D** Папаверин
- E** Морфін

18

У пацієнта раптово виникла задишка з подовженим видихом, дистанційні сухі хрипи. Хворий сидить у ліжку, спираючись на коліна. Шкіра бліда, пульс - 90/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст., частота дихання - 36/хв. Над легеньми перкуторно визначається коробковий звук, аускультативно - велика кількість сухих хрипів. Що в першу чергу треба зробити під час надання невідкладної допомоги?

- A** *Інгаляцію сальбутамолу із кишенькового інгалятора
- B** Виконати дихальну гімнастику
- C** Заспокоїти хворого
- D** Ввести в/м 2% р-н папаверину
- E** Ввести підшкірно 0,1 % розчин адреналіну

19

Жінка 25 років, яка страждає цукровим діабетом, протягом 2 днів скаржитися на слабкість, сонливість, зниження апетиту, поліурію, спрагу. На даний час хвора без свідомості, шкіра бліда, суха, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке з запахом ацетону у повітрі. Пульс - 96/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворої?

- A** *Кетоацидотична кома
- B** Печінкова кома
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремична кома
- E** Алкогольна кома

20

Хворий 48 років, через декілька хвилин після введення звичайної дози інсуліну відчув голод, тремтіння рук, а потім втратив свідомість. Шкіра бліда, волога, судомні посмикування м'язів. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Кетоацидотична кома
- C** Печінкова кома
- D** Уремична кома
- E** Гіперосмолярна кома

21

У пацієнта, що страждає на гіпертонічну хворобу, протягом 2-х годин погіршився стан : з'явилися нудота, біль у потилиці й ділянці серця, миготіння "мушок" перед очима.

Об'єктивно: обличчя гіперемійоване. АТ- 180/120 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A** *Гіпертонічний криз
- B** Інфаркт міокарда
- C** Прогресуюча стенокардія
- D** Гостра серцева недостатність
- E** Гостра судинна недостатність

22

Пацієнта Б. раптово укусила бджола. Після цього з'явилися скарги на ядуху, нудоту. При огляді: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична дихання утруднене, охриплість голосу, надсадний кашель. Пульс - 88/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A** *Набряк Квінке
- B** Кропив'янка
- C** Анафілактичний шок
- D** Сироваткова хвороба
- E** Серцева астма

23

У хворого 28 років, який страждає на виразкову хворобу шлунка, раптово виник біль в епігастральній ділянці, блювота "кавовою гущею" АТ- 80/40 мм рт.ст. Що в першу чергу необхідно зробити фельдшеру?

- A** *Покласти міхур з льодом на живіт
- B** Покласти грілку на живіт
- C** Ввести кордіамін
- D** Промити шлунок
- E** Дати вжити гарячу каву

24

Фельдшера швидкої допомоги викликано до пацієнта, у якого напад бронхіальної астми не минає на протязі однієї доби. Оберіть препарати для надання невідкладної допомоги:

- A** *Еуфілін, преднізолон
- B** Димедрол, астмопент
- C** Димедрол, пеніцилін
- D** Сальбутомол, адреналін
- E** Вікасол, димедрол

25

До фельдшера ФАПу звернулась жінка 52 роки із скаргами на головний біль, серцебиття, біль в ділянці серця. Хвора збуджена, шкіра гіперемійована, АТ- 180/110 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Який невідкладний стан виник у хворої?

- A** *Гіпертонічний криз
- B** Діабетична кома
- C** Гіперглікемічна кома
- D** Анафілактичний шок
- E** Серцева астма

26

На ФАПі після ін'єкції кетанолу хворий відчув загрудинний біль, задишку, запаморочення, біль в поперековій ділянці. Об'єктивно: пацієнт блідий, вкритий холодним потом, АТ- 60/35 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Який невідкладний стан виник у хворого?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Кардіогенний шок
- C** Гіпертензивний криз
- D** Гіпоглікемічна кома
- E** Серцева астма

27

Ви фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта А., 36 років, що страждає на цукровий діабет та отримує інсулін. Об'єктивно: свідомість відсутня, відмічаються судомні посмикування м'язів, блідість та вологість шкіри; Рs- 98/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Для надання невідкладної допомоги першочергово необхідно ввести:

- A** *40 мл 40% розчину глюкози в/в струминно
- B** 1 мл 0,1% р-ну норадреналіну в/в
- C** 1 мл 0,1% р-ну адреналіну в/м
- D** 500 мл 5% розчину глюкози в/в крапельно
- E** 10 ОД простого інсуліну п/ш

28

Фельдшер ФАП обстежує пацієнта К., 50 років, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, скаржиться на блювання, виражену кволість. Блювотні маси - кольору кавової гущі, випорожнення дьогтеподібні. Яке ускладнення запідозрити фельдшер?

- A** *Шлункову кровотечу
- B** Легеневу кровотечу
- C** Носову кровотечу
- D** Стравохідну кровотечу
- E** Кишкову кровотечу

29

Пацієнт А., 40 років, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на сильний біль у поперековій ділянці зліва з іррадіацією у статеві органи, стегно, часті позиви на сечовипускання. Найімовірніший попередній діагноз:

- A** *Напад ниркової кольки
- B** Гострий цистит
- C** Гострий пієлонефрит
- D** Гострий гломерулонефрит
- E** Гостра ниркова недостатність

30

В приймальне відділення доставлено хворого 20 р., без свідомості. В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС- 105/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

- A** *Інсулін
- B** Глюкозу
- C** Адреналін
- D** Реополіглюкин
- E** Папаверин

31

У приймальне відділення доставлено хворого з різким болем у поперековій ділянці, що виник після тряскої їзди. Біль віддає в промежину. Хворіє на сечо-кам'яну хворобу впродовж 5 років. Симптом Пастернацького різко позитивний. В аналізі сечі виявлені свіжі еритроцити. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- A** *Ниркову кольку
- B** Гострий апендицит
- C** Гострий аднексит
- D** Печінкову кольку
- E** Гострий радикуліт

32

У хворого на бронхіальну астму напад ядухи триває 2 години. Інголяції сульбутамолу, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Вимушене положення тіла, ЧД- 36/хв., кашель з незначним виділенням харкотиння. Рс- 84/хв. АТ- 140/80мм рт.ст. Дистанційні сухі хрипи. Який препарат найбільш доцільно приготувати?

- A** *Преднізолон
- B** Адреналін
- C** Ефедрин
- D** Астмопент
- E** Морфін

33

Хвора 48-ми років хворіє на цукровий діабет. Після введення звичайної дози інсуліну хвора відчула сильний голод, з'явилося відчуття тремтіння в тілі, різка слабкість, шкіра вкрилася потом. Через декілька хвилин хвора втратила свідомість. Об'єктивно шкіра волога, Рс- 80/хв, АТ- 150/90 мм рт.ст., виражений гіпертонус м'язів. Тони серця приглушені, в легенях везикулярне дихання, живіт м'який. Яке ускладнення виникло в хворі?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Гіперглікемічна кома
- C** Епілептичний напад
- D** Гіпертонічний криз
- E** Непритомність

34

На здоров'я пункті хімічного заводу проводиться забір донорської крові. Чоловік 24 років раптово зблід і неpritомнів. Зіниці вузькі, реагують на світло, кінцівки холодні. Пульс - 85/хв. АТ- 120/80 мм рт.ст. Невідкладна допомога:

- A** *Горизонтальне положення, нашатирний спирт
- B** Напівсидяче положення, нашатирний спирт
- C** Сидяче положення, нашатирний спирт
- D** Горизонтальне положення, адреналін
- E** Горизонтальне положення, ефедрин

35

До жінки 27 років викликали ШМД. Хвора без свідомості. Дихання шумне, запах ацетону з рота. Шкіра суха. Риси обличчя загострені. В анамнезі - цукровий діабет. Яке ускладнення розвинулось?

- A** *Гіперглікемічна кома
- B** Гіпоглікемічна кома
- C** Діабетична нефропатія
- D** Діабетична ангіопатія
- E** Діабетична нейропатія

36

Бригада СМП на вызове. У пацієнта 42 л. с туберкулезом легких после кашля отошла пеннистая алая кровь. Кожные покровы бледные. АД- 90/60 мм рт.ст. Какие медикаменты надо выбрать фельдшеру для оказания неотложной помощи?

- A** *Аминокaproновая кислота, кальция хлорид
- B** Глюкоза, адреналин
- C** Кордиамин, коргликон
- D** Анальгин, лазикс
- E** Стрептомицин индометацин

37

Фельдшера вызвали к женщине, жалующейся на “кинжальный” боль в эпигастрии. В анамнезе - язва желудка. Объективно: кожа бледная. При пальпации живот доскоподобен, напряжен. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Какое осложнение язвенной болезни возникло у женщины?

- A** *Перфорация
- B** Кровотечение
- C** Пенетрация
- D** Пилоростеноз
- E** Малигнизация

38

В приёмное отделение привезли мужчину с приступом резкой боли в поясничной области с права, иррадирующая в половые органы. В анамнезе - нефролитиаз. Объективно: пациент беспокоен, каждые 2-3 минуты меняет положение тела. Позитивный симптом Пастернацкого с права. Какие препараты необходимо приготовить для оказания неотложной помощи?

- A** *Анальгин, но-шпа
- B** Адреналин, атропин
- C** Инсулин, анальгин
- D** Строфантин, папаверин
- E** Эуфиллин, димедрол

39

Фельдшера вызвали к мужчине 52 лет, у которого 2 часа тому назад внезапно появилась резкая головная боль, головокружение, ноющая боль в области сердца, тошнота, дрожание во всем теле, частые позывы на моче испускание. Такое состояние возникло после стресса. Пациент возбужден, на коже лица красные пятна. Пульс - 110/мин., АД- 200/100 мм рт.ст. Какое осложнение наиболее вероятно?

- A** *Гипертонический криз
- B** Инфаркт миокарда
- C** Ишемический инсульт
- D** Отёк лёгких
- E** Сердечная астма

40

Фельдшера здоровпункту викликали до пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки зі скаргами на блювання “кавовою гущею”. При огляді на чолі краплини холодного поту, пульс - 130/хв., АТ- 70/50 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий при пальпації у надчеревній ділянці. Фельдшер для невідкладної допомоги першочергово приготує:

- A** *Натрія етамзилат
- B** Папаверин
- C** Анальгін
- D** Калія хлорид
- E** Церукал

41

Фельдшера ШМД викликали до пацієнта зі скаргами на напад ядухи, що триває 3 години. Об'єктивно: вимушене положення тіла, ЧД - 36/хв., дистанційні сухі хрипи, пульс - 84/хв. АТ- 130/80 мм рт.ст. Інгаляція сальбутамолу ефекту не дала. Яка буде наступна дія фельдшера?

- A** *Введення еуфіліну
- B** Введення тренталу
- C** Введення анальгін
- D** Введення дімедролу
- E** Введення галідору

42

Фельдшера “швидкої допомоги” викликали до пацієнта, який скаржиться на раптовий, нападopodobний біль у поперековий ділянці справа. Біль іррадіює у статеві органи, стегно. Хворий неспокійний. Симптом Пастернацького різко позитивний справа. Фельдшер підготує для надання невідкладної допомоги:

- A** *Баралгін
- B** Мезатон
- C** Дімедрол
- D** Ортофен
- E** Кордіамін

43

Ви - фельдшер здоров'я пункту. Після проведення ін'єкції вітаміну B_6 у пацієнта через 15 хвилин з'явилися відчуття жару, стиснення за грудниною, запаморочення, потім він втратив свідомість. Шкіра бліда, АТ- 80/50 мм рт.ст. Для надання долікарської допомоги пацієнту буде використано:

- A** *Преднізолон
- B** Гепарин
- C** Аналгін
- D** Папаверина гідрохлорид
- E** Атропіна сульфат